


	MOD SPECIFICA PRODOTTO			MOD SPEC
	REVISIONE	N° 00	DATA 17/07/2019	Pagina 1 di 1

CODICE ARTICOLO		711 – 712 – 714	
DENOMINAZIONE COMMERCIALE		Cappasanta Atlantica ½ guscio	
DENOMINAZIONE SCIENTIFICA		Pecten maximus (SCE)	
METODO DI PRODUZIONE ZONA DI CATTURA		(712-714) Pescato Atlantico Nord Orientale – Canale della Manica Orientale 27.VII.D (711) Pescato Atlantico Nord Orientale – Mare del Nord Meridionale, FAO 27.4.C pescato con draghe	
DISPONIBILITA' SUL MERCATO		dicembre, aprile, agosto, su richiesta; da novembre a febbraio	
CARATTERISTICHE SENSORIALI		odore delicato gradevole e salmastro; colore lucido, uniforme	
DIMENSIONI e INCROSTAZIONI ESTERNE		≥ 100 mm -	
% GUSCI ROTTI		-	
PIENEZZA		polpa che riempie la cavità palleale almeno del 30%	
ALLERGENI		MOLLUSCHI	
IMBALLAGGIO I materiali di imballaggio sono idonei al contatto con gli alimenti come da normativa vigente		imballo primario: casse in legno/plastica da 3 kg con etichetta;	
ETICHETTA			
T° DI TRASPORTO		temperatura prossima a quella del ghiaccio in fusione (0°/±2 °C ± 2°C)	
CARATTERISTICA DEL PRODOTTO SECONDO D. Lgs 198/2021		Prodotto deperibile	
PARAMETRI MICROBIOLOGICI, CHIMICI E BIOTOSSICOLOGICI			
Salmonella		Assente in 25 g.	
Listeria monocytogenes		Assente in 25 g.	
Vibrio parahaemoliticus		Assente in 25 g.	
Vibrio cholerae		Assente in 25 g.	
Virus Epatite A		Assente	
Norovirus		Assente	
E. Coli		su 1 u.c.: ≤ 230 MPN/100 g su 5 u.c.: 4 u.c.: ≤ 230 MPN/100 g / 1 u.c.: ≤ 700 MPN/100 g	
Biotossine Algali	PSP	≤ 800 µg di equivalente saxitossina/Kg di parte edibile.	
	LIPOFILE	ACIDO OKADAICO, DINOPHYTOSSINE ≤ 160 µg di acido okadaico/Kg di parte edibile; YESSOTOSSINE ≤ 3,75 mg di equivalente yessotossina/Kg di parte edibile; AZASPIRACIDI ≤ 160 µg di equivalente azaspiracido/kg di parte edibile;	
	ASP	≤ 20 milligrammi di ac domoico/Kg di parte edibile	
Metalli pesanti	Mercurio	≤ 0,5 ppm	
	Piombo	≤ 1,5 ppm	
	Cadmio	≤ 1 ppm	
Diossine e PCB diossina simile		≤ 6,50 pg/g peso fresco	
Approvata DIR COMM il:		10/02/2026	